

ALAVIS™ CBD

Vliv podávání veterinárního přípravku ALAVIS™ CBD na projevy kinetózy u psů

Pacient č. 1

Nationále: pes, samice, vipet, 1,3 roku

Popis případu:

Fenka před a při jízdě autem vykazuje **vysokou míru stresu, sliní a zvrací.**

Fence byl opakovaně podán 5–30 minut před jízdou ALAVIS™ CBD. Jednalo se o cesty autem v délce 60 a 250km. Fenka po aplikaci **nevykazuje žádné známky stresu, nevolnosti, nesliní, ani nezvrací.**

Pacient č. 2

Nationále: pes, samice, Jack Russell teriér, 1 rok

Popis případu:

Fena při cestách autem vykazuje vysokou míru stresu, obvykle do 5 minut poprvé zvrací, poté podle délky cesty zvrací opakovaně.

První podání ALAVIS™ CBD 30 minut před jízdou. Během dvouhodinové cesty fena nejprve ležela a poté klidně seděla a rozhlížela se, bez známek stresu. **Bylo to poprvé za dobu, po kterou ji majitelka má u sebe, kdy netrpěla kinetózou a nebyla zcela vystresovaná.**

Druhé podání 15 minut před dvouhodinovou cestou autem - na jejím konci fena jednou zvracela, ale byla klidná.

Třetí aplikace 30 minut před dvouhodinovou cestou – fena po celou dobu zcela klidná, nezvrací.

Čtvrtá aplikace 2 hodiny před devadesátiminutovou jízdou - fenka mírně sliní, ale je klidná.

Pacient č. 3

Nationále: pes, samice, Parson Russell teriér, 1 rok

Popis případu:

Neochota nastoupit do vozu. Během cesty vždy sliní. ALAVIS™ CBD podáván 30 minut před cestou. Při cestách 12 -220 km, fena opakovaně zcela **bez hypersalivace po celou dobu jízdy.**

Pacient č. 4

Nationále: pes, samice, border teriér, 1 rok

Popis případu:

Fena trpí těžkou kinetózou – v průběhu celé cesty výrazně sliní a 3-6× zvrací.

První aplikace 60 minut před cestou – fena sliní a během cesty 2× zvrací.

Druhá aplikace 60 minut před cestou ve dvojnásobné dávce - fena sliní a během cesty 2x zvrací.

Třetí, čtvrtá a pátá aplikace 2-4 hodiny před cestou v dvojnásobné dávce – fena sliní a během jízdy 1-2× zvrací.

Komentář: U této feny se jedná o těžký případ kinetózy reagující jen na medikaci maropitantem (centrálně působící antiemetikum). Po aplikaci **ALAVIS™ CBD** došlo k redukci klinických projevů kinetózy, ale nikoli k jejich vymizení.

Pacient č. 5

Nationále: pes, samice, Parson Russell teriér, 4 roky

Popis případu:

Fena během každé cesty vozem sliní a někdy i zvrací. Feně byl **ALAVIS™ CBD** podáván 30 minut před cestou. Během pěti jízd s proměnlivou délkou 12 až 660 km. **Během žádné z cest fena neslinila.** S výjimkou jedné cesty, kdy 1× zvracela, **nezvracela.**

Pacient č. 6

Nationále: pes, samec, kříženec, 3 roky, 25 kg

Popis případu:

Pes během jízdy v autě vždy vykazuje hypersalivaci. **ALAVIS™ CBD** podáván 30 minut před jízdou. První aplikace v doporučené dávce bez efektu – pes vykazuje výrazné slinění.

Druhá, třetí a čtvrtá aplikace 1,5 násobku základní dávky 30 minut před jízdou – pes je zcela klidný a po celou dobu jízdy vozem nesliní.

Závěr:

Všichni majitelé (kromě majitelky pacienta č. 4) popisují výrazný účinek veterinárního přípravku **ALAVIS™ CBD** na potlačení příznaků kinetózy a projevů stresu u psů během přepravy. Majitelé mají zájem **ALAVIS™ CBD** podávat dlouhodobě.

MVDr. Hana Vanková,
Patron ca, s. r. o.